И Н С Т Р У К II И Я ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРОДУКТА «БИОСОРБ-БИФИДУМ»

Продукт представляет собой живые клетки бифидобактерий, иммобилизованные на поверхности энтеросорбента. Выпускается в виде микрогранул (порошка).

предназначен для нормализации энлоэкологии микробиоценоза желудочно-кишечного резистентности повышения неспецифической тракта, организма, восстановления и коррекции микрофлоры кишечника. Терапевтический эффект и профилактический эффект продукта обусловлен совместным действием живых клеток бифидобактерий, иммобилизованных на энтеросорбенте, и защитными и детоксикационными свойствами самого энтеросорбента. Иммобилизованные бифидобактерии более устойчивы к инактивирующим факторам внешней среды и желудочно-кишечного тракта, что повышает их сохранность при длительном хранении и при прохождении через желудок. Это обеспечивает более высокую степень колонизации кишечника при использовании данного продукта по сравнению с жидким концентратом бифидобактерий. Энтеросорбент, помимо функции доставки бифидобактерий в кишечник, выполняет и детоксикационную функцию: путём активного поглощения токсинов снижает как местный, так и общий токсикоз, уменьшает метаболическую нагрузку на органы детоксикации (печень, почки, иммунную систему). Bcë это приводит К синергетическому усилению терапевтического эффекта.

«БИОСОРБ-БИФИДУМ» применяют:

- при дисбактериозах различной этиологии;
- при кишечных инфекциях бактериальной и вирусной этиологии (сальмонелез, дизентерия, вирусные диареи);
- при кишечных дисфункциях неустановленной этиологии (запоры, поносы);
- после длительной антибактериальной, гормональной и лучевой терапии;
- при различных формах гастроэнтеропатии (энтероколит, колит);
- при токсикозах (эндо- и экзотоксикозы, ранние стадии отравлений любыми экзогенными ядами при оральном пути поступления токсина);
- при иммунологической недостаточности, повышенной аллергизации организма.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Суточную дозу продукта — 2-4 г. в зависимости от тяжести клинических проявлений — принимают через 20-30 мин. после завтрака. Дозу продукта смочить или суспендировать в небольшом количестве питьевой воды или молока, запить водой или молоком. Допускается приём продукта одновременно с жидкой или пастообразной пищей. Длительность курса лечения определяется тяжестью клинических проявлений и составляет 1-4 недели. При необходимости курс приёма можно повторить.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Противопоказаний и побочных действий не выявлено.

ФОРМА ВЫПУСКА: Флаконы по 10 г.

ХРАНЕНИЕ: Хранить в сухом, защищённом от солнечного света месте при температуре 4-10°C. Срок годности – 12 месяцев.

За дополнительной информацией обращаться:

630098, Новосибирск-98, а/я 94, ООО НПЦ «Вектор- Вита»,

http://vector-vita.narod.ru, vector-vita@ngs.ru